Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya

La Cigarreta Electrònica: Què en sabem? Què estem fent?

Guió

- Algunes dades globals
- Les cigarretes electròniques: actuacions fetes

Evolució del tabaquisme a Catalunya

Prevalença de fumadors diaris i ocasionals



*Fumadors diaris + ocasionals

Fonts: Enquesta drogodependències, DGSP, DS (1990, 1998)

Enquesta de Salut de Catalunya, DS (1994, 2002, 2006, 2011, 2012, 2013)

Elaboració ASPCat, 2014

Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya

L'última enquesta ESCA revela que la prevalença del tabaquisme a Catalunya ha passat del 29,5% el 2011 al 26,5% el 2013.

Aquesta caiguda de 3 punts percentuals equival a 189.523 fumadors.



190.000 fumadors menys entre 2011 i 2013!

*Fumadors diaris + ocasionals

Fonts: Enquesta drogodependències, DGSP, DS (1990, 1998)

Enquesta de Salut de Catalunya, DS (1994, 2002, 2006, 2011)

Elaboració ASPCat, 2012

Evolució del consum de tabac entre els estudiants d'educació secundària de 14 a 18 anys. Catalunya, 1994-2012

Consum de tabac	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Algun cop a la vida	67,0	68,7	67,1	67,1	63,1	65,2	53,0	51,0	45,1	45,5
Últims 12 mesos	—	—	—	—	—	—	39,8	43,3	36,2	37,0
Últims 30 dies	31,0	34,8	32,6	34,1	29,5	31,3	30,9	37,3	29,0	28,1
Diàriament	—	—	—	—	—	23,0	15,8	15,8	13,9	12,4

Font: Subdirecció General de Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya. Anàlisi de l'*Enquesta estatal sobre l'ús de drogues a l'ensenyament secundari (ESTUDES),* 1994-2012. Observatori Espanyol sobre Drogues (DGPNSD).

Evolució del consum de tabac entre els estudiants d'educació secundària de 14 a 18 anys. Catalunya, 1994-2012

Consum de tabac	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Algun cop a la vida	67,0	68,7	67,1	67,1	63,1	65,2	53,0	51,0	45,1	45,5
Diàriament	—	—	—	—	—	23,0	15,8	15,8	13,9	12,4

Entre 1994 i 2012 la prevalença del consum de tabac diari en adolescents ha disminuït un 46% (del 23 al 12,4%)

Font: Subdirecció General de Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya. Anàlisi de l'*Enquesta estatal sobre l'ús de drogues a l'ensenyament secundari (ESTUDES),* 1994-2012. Observatori Espanyol sobre Drogues (DGPNSD)

Evolució del consum de tabac entre els estudiants d'educació secundària de 14 a 18 anys. Catalunya, 1994-2012

Consum de tabac	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
A Catalunya, cada dia comencen a fumar 3 adolescents de 14 anys. Almenys 1 d'ells morirà precoçment a causa del tabac										
Últims 30 dies	31,0	34,8	32,6	34,1	29,5	31,3	30,9	37,3	29,0	28,1
Diàriament	—	—	—	—	—	23,0	15,8	15,8	13,9	12,4

Font: Subdirecció General de Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya. Anàlisi de l'*Enquesta estatal sobre l'ús de drogues a l'ensenyament secundari (ESTUDES),* 1994-2012. Observatori Espanyol sobre Drogues (DGPNSD).

Consum de tabac en treballadors dels equips atenció primària (EAP)

5.459 enquestes (157 ABS)

Variables

- Sexe
- Professió
- Consum de tabac
- Ús previ de fàrmacs

Sexe: ☐ Home ☐ Dona

Professió:

- ☐ Metge/essa
- ☐ Infermer/a
- ☐ Auxiliar infermeria
- ☐ Personal administratiu
- ☐ Treball Social
- ☐ Odontòlegs
- ☐ Altre. Especificar _____

En relació amb el tabac ets (marqueu només una) :

- ☐ Mai he fumat
- ☐ He fumat però fa MÉS d'un any que no fumo (ex-fumador)*
- ☐ He fumat però fa MENYS d'un any que no fumo*
- ☐ Fumo actualment*

*Sisplau, tant si has fumat en el passat com si fumes actualment, si has fet algun intent per deixar de fumar.... **has utilitzat alguna vegada fàrmacs gratuïts del Programa Atenció Primària Sense Fum (PAPSF)?**

☐ Sí ☐ No

Consum de tabac en professionals de l'atenció primària



Un 8% dels que fumen o han fumat ha rebut ajuda (i fàrmacs) per deixar de fumar.
Dels que han rebut ajuda, un 43,5% han deixat de fumar i un 14,6% ho estan deixant.

Consum de tabac en professionals de l'atenció primària



Aquestes dades confirmen la tendència a la baixa del consum de tabac entre el personal dels centres d'atenció primària, que el 2002 era del 24,5% i el 1982, representava el 52,8%.

Consum de tabac per sexe



Dones

Consum de tabac per professió



	Fumadors	No fumadors	Exfumadors	Deixant de fumar
Metges	12,3%	55,4%	28,2%	4,1%
Infermers	13,6%	44,6%	37,3%	4,5%
Odontolègs	15,5%	52,9%	26,0%	5,7%
Treballadors socials	19,3%	42,1%	32,5%	6,1%
Adminisratius	25,8%	39,9%	30,1%	4,2%
Auxiliars d'infermeria	27,0%	37,9%	31,5%	3,6%
Altres professionals	29,6%	43,7%	19,7%	7,0%

El compliment de la llei 42/2010 continua sent òptim

	Gener '06 Des'13	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Denúncies	3.205	276	623	517	558	433	465	152	181
Inspeccions	128.961	9.966	11.380	11.238	19.696	18.634	24.899	17.221	15.927
Inspeccions incorrectes	11.083	1.531	1.861	1.483	1.696	789	1.904	940	879
Expedients incoats	1.023	78	177	195	82	101	96	126	168
Expedients amb sanció	721	21	118	135	76	76	43	114	138

Els eixos d'actuació

Catalunya

1. Evitar l'exposició involuntària al fum del tabac/crear un ambient social lliure de fum.

2. Prevenir l'inici del tabaquisme en la població adolescent i jove.

3. Promoure l'abandonament tabàquic en la població fumadora.

4. . Lluitar contra les desigualtats incorporant la perspectiva de gènere i de classe social

CIGARRILLOS ELECTRONICOS ¿QUÉ SON?

- los cigarrillos electrónicos administran un aerosol al pulmón de los usuarios mediante el calentamiento de una solución
- Los principales constituyentes de la solución en volumen, además de nicotina cuando está presente, son propilenglicol, el glicerol y sustancias aromatizantes

A. Peruga, 2014

- ¿HACEN DAÑO A LA SALUD?
- ¿SIRVEN PARA DEJAR DE FUMAR?
- ¿CONTRIBUYEN A LOS ESFUERZOS ANTITABAQUICOS?

MITOS Y REALIDADES

EXPOSICION	
TOXICO	TIPO
	DOSIS
	INTENSIDAD
	FRECUENCIA
	TOPOGRAFIA

- Muy pocos cigarrillos electrónicos han sido sometidos a una evaluación toxicológica completa
- Perfil toxicológico (tipos y niveles de sustancias tóxicas) de los aerosoles dependen del diseño del dispositivo (el material de la resistencia, la potencia de la batería)
- No hay pruebas estandarizadas para evaluar y comparar la toxicidad del CE entre marcas y entre productos del tabaco
- No hay consenso científico sobre los datos adecuados (listas de químicos, sustancias tóxicas y biomarcadores de exposición) y paradigmas procedimentales (producción de aerosoles e-cigarrillo) para comparar CE con otros productos

Información muy limitada para determinar cantidades y duración de la exposición

Succion: más larga y profunda que para el cigarrillo convencional

¿HACEN DAÑO A LA SALUD?

Limitaciones de la evidencia

A. Peruga, 2014

El vapor de los cigarrillos electrónicos contiene

- algunos tóxicos NO presentes en el humo del tabaco
- algunos citotóxicos y carcinógenos presentes en el humo del tabaco
- En promedio sus niveles son 1 a 2 órdenes de magnitud menor que en el humo del tabaco, pero más alto que en un inhalador de nicotina. Sin embargo, ciertas marcas producen niveles de algunos de estos agentes cancerígenos tan altos como en algunos cigarrillos

¿HACEN DAÑO A LA SALUD?

A. Peruga, 2014

Nivel del tóxico: comparación entre vapor CE, humo cigarrillo y inhalador nicotina

Toxico	Vapor CE 15 puffs	Humo de cigarrillo	Inhalador nicotina 15 puffs
Formaldehyde (µg)	0.2-5.61	1.6-52	0.2
Acetaldehyde (µg)	0.11-1.36	52-140	0.11
Acrolein (µg)	0.07-4.19	2.4-62	ND
o-methylbenzaldehyde (µg)	.13-.71	--	0.07
Toluene(µg)	ND-0.63	8.3-70	ND
p,m-xylene (µg)	ND - 0.2	--	ND
NNN (ng)	ND - 0.00043	0.0005-0.19	ND
NNK (ng)	ND-0.00283	0.012-0.11	ND
Cadmium (ng)	ND - 0.022	--	0.003
Nickel (ng)	0.011-0.029	--	0.019
Lead (ng)	0.003-0.057	--	0.004

Goniewicz et al.

¿HACEN DAÑO A LA SALUD?

EXPOSICION	DAÑO
	LABORATORIO
INTERACCION	MARCADORES HUMANOS
	ENFERMEDAD HUMANOS

- Existen 2 y muestran alteraciones celulares
- No existen
- No existen estudios sobre daño por inhalación crónica

¿HACEN DAÑO A LA SALUD?

- DEPENDE DE LA CAPACIDAD DEL CE PARA ADMINIS-TRAR LA DOSIS DE NICOTINA, LA SUSTANCIA ADICTIVA DEL TABACO, QUE REQUIERE EL ADICTO
- EL SUMINISTRO DE NICOTINA VARÍA AMPLIAMENTE, DESDE MUY BAJO A NIVELES SIMILARES A LOS CIGARRILLOS EN FUNCIÓN DE
  - LAS CARACTERÍSTICAS DEL APARATO
  - EL COMPORTAMIENTO DEL USUARIO Y
  - LA CONCENTRACIÓN E-LÍQUIDO DE NICOTINA
- HAY MUY POCOS ESTUDIOS

¿SIRVEN PARA DEJAR DE FUMAR?

A. Peruga, 2014

- LA NICOTINA TIENE EFECTOS ADVERSOS DURANTE EL EMBARAZO Y CONTRIBUYE A LA ENFERMEDAD CARDIO-VASCULAR. AUNQUE EN SÍ LA NICOTINA NO ES UN CARCINÓ-GENO, PUEDE FUNCIONAR COMO UN PROMOTOR TUMORAL
- EL RIESGO DE LA NICOTINA EN LAS DOSIS EXISTENTES EN LOS MEDICAMENTOS PARA DEJAR DE FUMAR ES PEQUEÑO. NO SE SABE SI LO MISMO ES CIERTO PARA LAS DOSIS MÁS ALTAS DE NICOTINA ADMINISTRADAS POR ALGUNOS CE
- EL NÚMERO DE INCIDENTES POR INTOXICACIÓN POR NICOTINA HA AUMENTADO

RIESGOS DE LA NICOTINA

- SOLO HAY UN ENSAYO CLÍNICO CONTROLADO (LA MEJOR METODOLOGIA PARA RESPONDER A ESTE TIPO DE PREGUNTA) QUE COMPARA LOS CE CON PARCHES DE NICOTINA EN POBLACION GENERAL
- RESULTADOS: LOS CE TIENEN UNA EFICACIA IGUAL DE BAJA QUE LOS PARCHES USADOS SIN NINGUNA AYUDA
- LA EFICACIA DE LOS PARCHES USADOS SIN AYUDA ES LA MENOR DE TODOS LOS METODOS MEDICINALES

¿SIRVEN PARA DEJAR DE FUMAR?

A. Peruga, 2014

- ¿QUÈ IMPACTO TIENE SOBRE EL MENSAJE ANTITABÁQUICO?
- ¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA INDUSTRIA TABAQUERA?
- ¿ES PUERTA DE ENTRADA A LA ADICCIÓN Y AL TABACO PARA JÓVENES?
- ¿RENORMALIZA SU MARKETING EL USO DEL TABACO?
- ¿DEBILITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESPACIOS LIBRES DE HUMO?

¿CONTRIBUYEN A LOS ESFUERZOS ANTITABÁQUICOS?

- **HASTA AHORA EL MENSAJE HA SIDO "DEJAR EL TABACO"**
- **CON LOS CE LOS MENSAJES SON:**
  - SI NO PUEDES DEJAR DE FUMAR PÁSATE AL CE
  - NO HACE FALTA QUE DEJES TU ADICCIÓN A LA NICOTINA PÁSATE AL CE
  - SIGUE FUMANDO HASTA QUE NO PUEDAS, USA EL CE

DILUYE EL MENSAJE

¿CONTRIBUYEN A LOS ESFUERZOS ANTITABÁQUICOS?

- Se está concentrando la producción de CE en la industria tabaquera
- El interés de la IT en productos de “menor riesgo” radica en mantener el status quo a favor de los cigarrillos y proporcionar una fuente de beneficios si el modelo de cigarrillo fracasa
- los beneficios de reputación son una ventaja adicional

¿CONTRIBUYEN A LOS ESFUERZOS ANTITABÁQUICOS?

A. Peruga, 2014

- Los espacios libres de humo protegen a los no fumadores, incentiva dejar de fumar y desnormaliza el uso de tabaco
- El uso de CE antagoniza estas funciones y hace difícil hacer cumplir las políticas de espacios libres de humo

¿CONTRIBUYEN A LOS ESFUERZOS ANTITABÁQUICOS?

A. Peruga, 2014

LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

¿HACEN DAÑO A LA SALUD?

NO SON INOCUOS,PERO PODRÍAN SER MENOS NOCIVOS QUE EL TABACO

¿SIRVEN PARA DEJAR DE FUMAR?

TIENEN UNA EFICACIA BAJA

¿CONTRIBUYEN A LOS ESFUERZOS ANTITABAQUICOS?

HAY SERIAS DUDAS

La cigarreta electrònica és perjudicial per a la salut. Ho sabia?



La cigarreta electrònica s'hauria de prohibir en els espais públics tancats, ja que se'n desconeixen els efectes sobre altres persones?



Creu que la cigarreta electrònica pot influir en el fet que els joves comencin a fumar?



Creu que la cigarreta electrònica pot influir en el fet que els fumadors de tabac no es plantegin deixar de fumar definitivament?



Creu que s'hauria de prohibir la publicitat de les cigarretes electròniques?



Utilitzo la cigarreta electrònica: 6%

– La compagino amb el tabac: 44,5%

Utilitza la cigarreta electrònica en llocs públics tancats on està prohibit el tabac? 25%

Prioritat de Salut Pública

- La presència creixent de les **cigarretes electròniques** representa una preocupació comuna per a **les autoritats de Salut Pública d'arreu del món.**

- En concordança amb les propostes de l'**OMS**, del **Consell Assessor sobre Tabaquisme** (CAT) i de les noves normatives s'ha fet un esforç continuat d'actuacions des de juliol de 2013.

Esforç continuat des de Salut Pública

Participació i suport posicionament Xarxes Hospitals i Atenció Primària Sense Fum

Revisió situació

Informació a MSSSI/ impuls actuacions

Juliol -octubre2013

1eres Recomanacions CAT

Consideracions i recomanacions del CAT (octubre 2013)

- No se n'ha de permetre en cap cas **la venda a menors d'edat.**
- La prohibició de la venda ha de ser visible en tots els llocs on es promocionin i venguin cigarretes electròniques.
- Cal promoure el desenvolupament de normes que en **s, començant pels centres de l'administració pública, especialment de Salut i Ensenyament.**
- Cal generar, des de l'administració sanitària, **documents informatius** sobre les cigarretes electròniques destinats als ciutadans i als professionals,
- Cal promoure estudis que permetin **monitoritzar l'evolucio del consum** de cigarretes electròniques a Catalunya, el contingut dels vapors que emeten i els efectes tant sobre els usuaris com sobre altres persones exposades. Es considera molt rellevant la incorporació al qüestionari bàsic de l'**ESCAc** d'una pregunta que permeti conèixer i monitoritzar la prevalenc s (mono/dual).
- Es recomana la realització d'un **espai de trobada científica** sanitària, buscant una aliança organitzativa amb altres institucions i organitzacions professionals.

Actuacions fetes: regulació de l'ús

- **Instrucció del CatSalut 08/2013,** de 30 de desembre, d'aplicació de la prohibició de l'ús, la promoció i la venda de substàncies que poden generar dependència als sistemes electrònics d'administració de nicotina / cigarretes electròniques en els centres, serveis i establiments sanitaris del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).



CatSalut
Servei Català de la Salut

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

CatSalut. Instrucció 08/2013
Aplicació de la prohibició de l'ús, la promoció i la venda de substàncies que poden generar dependència als sistemes electrònics d'administració de nicotina/cigarretes electròniques en els centres, serveis i establiments sanitaris del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT)

Assumpte

Aplicació de la prohibició de l'ús, la promoció i la venda de substàncies que poden generar dependència als sistemes electrònics d'administració de nicotina/cigarretes electròniques en els centres, serveis i establiments sanitaris del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Àmbit d'aplicació

1. Exposició de motius

A Catalunya, el consum de tabac constitueix un dels principals problemes per a la salut pública, sent responsable de la mort prematura de al voltant de 9.000 morts cada any, a través de més de 25 malalties relacionades amb el seu consum.

Des de fa uns anys ha augmentat la presència i comercialització de sistemes electrònics d'administració de nicotina/cigarretes electròniques a Catalunya. Els estudis científics

Regulació de l'ús*

- Normativa estatal *(La 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, modificada per Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries*), estableix limitacions a la publicitat de cigarretes electròniques i prohibeix tant la seva venda als menors de 18 anys com el seu ús a les dependències de les administracions públiques, centres educatius i sanitaris, parcs infantils i vehicles de transport públic.

**** Catalunya, i després altres CCAA, van demanar al MSSSI que s'avancés en la regulació de l'ús***

Directiva europea

- Les Institucions Europees van aprovar el 26 de febrer una nova directiva en matèria de fabricació, presentació i venda dels productes del tabac i dels productes relacionats, que regula diferents qüestions en relació a les característiques de les cigarretes electròniques comercialitzades a la Unió Europea, la seva publicitat i el seu etiquetatge.
- Els continguts d'aquesta directiva no entren en vigor de forma automàtica, sinó que han de ser transposats a la normativa dels Estats membres en un termini de dos anys.

Que més estem fent?

- Treball conjunt amb el CAT /Societats Científiques en el marc del PINSAP.
- Inclosa una pregunta a l'ESCAc per vigilar-ne el consum.
- Informació en webs/ canal salut/ rodes i notes de premsa/ atenció a mitjans per a ciutadans i professionals.
- Jornada científica.
- Video-càpsula.

Informació al canal salut



La salut de la A a la Z

C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

Novetat

Cigarretes electròniques

eCigarretes

Cigarretes electròniques | Descripció | Riscos | Sabíeu què? | Normativa | Enllaços d'interès

Normativa

Llei 3/2014, de 27 de març

Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprova pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. Modifica diversos articles de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, regulant la publicitat, venda i ús de cigarretes electròniques.

CatSalut. Instrucció 08/2013, de 30 de desembre

Aplicació de la prohibició de l'ús, la promoció i la venda de substàncies que poden generar dependència als sistemes electrònics d'administració de nicotina/cigarretes electròniques en els centres, serveis i establiments sanitaris del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT)

M'agrada 14 | Tweet 40 | g+1 0 | Comparteix:

Data d'actualització: 03.04.2014

Informació sobre els llocs on n'està prohibit l'ús

Llocs on no es pot fumar cigarretes electròniques ni altres dispositius susceptibles d'alliberar nicotina.

- **Centres i dependències de les administracions públiques i entitats de dret públic.**
- **Centres, serveis i establiments sanitaris**, així com en els espais a l'aire lliure o coberts, compresos als seus recintes.
- **Centres docents i formatius**, excepte en els espais a l'aire lliure de els centres universitaris i dels exclusivament dedicats a la formació de adults, sempre que no siguin accessos immediats als edificis i voreres circumdants .
- **Mitjans de transport públic urbà i interurbà, mitjans de transport ferroviari, i marítim, així com en aeronaus de companyies espanyoles o vols compartits amb companyies estrangeres.**
- **Recintes de parcs infantils i àrees o zones de joc per a la infància.** Espais a l'aire lliure acotats que continguin equipament o condicionament destinats específicament per al joc i esplai de menors.

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Secretaria de Salut Pública

video-càpsula

Situació actual

- Prohibit el consum en centres de l' administració pública.
- Prohibida la venda a menors.
- Regulada parcialment la publicitat.
- Aprovada una directiva europea que en regula la producció i la informació a consumidors (transposició als Estats obligada en 2 anys)

Esforç continuat des de Salut Pública

Participació i suport posicionament Xarxes Hospitals i Atenció Primària Sense Fum

Informació a MSSSI/ impuls actuacions

Juliol - octubre2013

1eres Recomanacions CAT

Informació a població i professionals al Canal Salut i web ASPCat

Posicionament públic

Instrucció CatSalut

Introducció pregunta ESCAc

Jornada

Octubre 2013- abril 2014

2ones Recomanacions CAT

Consideracions CAT 25.03.2014 / Actuacions SP

Es considera **positiu l'avenç que han suposat**:

- la publicació de la **Instrucció del CatSalut** prohibint la promoció, venda i ús de cigarretes electròniques als centres del SISCAT,
- la **inclusió d'una pregunta sobre ús de cigarretes electròniques al qüestionari de l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCAc)** i
- l'organització d'una **jornada científica sobre cigarretes electròniques el 22 d'abril.**

Consideracions CAT 25.03.2014 / Actuacions SP

- També mereix una consideració global favorable l'aprovació a les Corts de la Llei 3/2014, que inclou algunes modificacions de la Llei 28/2005, regulant diversos aspectes de la publicitat de cigarretes electròniques, prohibint expressament la **seva venda a menors, i limitant el seu ús en alguns espais públics.**

Implicació: Aplicació a Catalunya. Inclusió en les inspeccions

Consideracions CAT 25.03.2014 / Actuacions SP

- el CAT estima que segueix sent necessari que la normativa d'aplicació a Catalunya i/o al conjunt de **l'Estat incorpori el més aviat possible els preceptes de la nova directiva europea, i que la publicitat i l'ús de les cigarretes electròniques siguin sotmesos a les mateixes limitacions vigents que en el cas de les cigarretes convencionals.**

Implicació: Impuls a nivell del MSSSI

Propers passos

- Mantenir/reforçar la vigilància:
  - Enquesta específica en profunditat (qüestionari ja dissenyat)
  - Senyalització: inclusió de la prohibició específica
  - Valoració en inspeccions
- Impulsar l'avenç i la transposició de la directiva Europea a nivell del MSSSI.

Esforç continuat des de Salut Pública

Participació i suport posicionament Xarxes Hospitals i Atenció Primària Sense Fum

Informació a MSSSI/impuls actuacions

Juliol -octubre2013

Informació a població i professionals al Canal Salut i web ASPCat

Posicionament públic

Instrucció CatSalut

Introducció pregunta ESCAc

Jornada

Octubre 2013-abril 2014

Aplicació nova normativa

Enquesta

Video-càpsula

Impuls a nivell MSSSI/ transposició directiva

1eres Recomanacions CAT

2ones Recomanacions CAT

Jornada 22.04.2014

Servicio de Información Toxicológica del Ministerio de Justicia

- Entre el 1 de gener de 2013 i el 26 d'abril 2014 s'havien rebut 64 consultes al Servei en les que el producte implicat era la cigarreta electrònica.
- D'elles durant tot 2013 va haver 29 consultes i en els 4 primers mesos de 2014 va haver 35,
- Tendència creixent molt marcada.

Altres efectes

Dades poblacionals de consum a Catalunya 2013: Un 9,7% de la població adulta les ha provat, 1,5% les utiliza



Les han provat molt més les persones joves (16,7% dels de 18-24 anys, 2% de forma habitual), però les que més les utilitzen regularment son les de 25 a 34 anys (2,6%).

Un 58,2% pensen que son perjudicials per a la salut, un 30,3 no ho sap, només un 10,6% pensen que no ho son.

Pregunta 57

Creu vostè que les cigarretes electròniques són perjudicials per la salut de les persones que les utilitzen?

N=1600; resposta simple; %



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Secretaria de Salut Pública

1714 2014

Pòsters per als centres de salut

Suport a estratègies OMS