



VIII TROBADA DEL PROGRAMA ATENCIÓ PRIMÀRIA SENSE FUM



Catalunya sense fum...i Girona més!

Girona, 23 de novembre de 2017

PREVALENÇA DE CONSUM DE TABAC I CONEIXEMENTS EN TABAQUISME EN ESTUDIANTS DE GRAU D'INFERMERIA DE CATALUNYA (ECTEC).


• **Autors:** A Baena, M Fu, Y Castellano, A Bueno, A López; C Martínez

1 (ICO-HIBELL) 2 (Representant en tabaquisme del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Girona) 3 (Repres-

Antecedents: Les infermeres són agents de salut claus en la prevenció i control del tabaquisme. La formació de grau hauria d'aportar els coneixements, habilitats i tècniques necessàries per desenvolupar intervencions eficaces en aquest àmbit. No obstant això, es desconeix quin és la prevalença de consum de tabac i el nivell de coneixements adquirits dels estudiants d'infermeria a Catalunya.


Objectiu: Analitzar la prevalença de consum de tabac en estudiants d'infermeria i descriure els determinants, patró de consum, formació rebuda i coneixements autorreportats en tabaquisme.

Resultats: Prevalença de consum (I)




Sense diferències per sexe ni curs, però sí per escoles (del 22,4 al 41,5%; p <0,001)

Mostra



Metodologia: Estudi multicèntric de prevalença mitjançant qüestionari autocomplementat, dirigit a la totalitat d'estudiants de les 15 Escoles de Grau d'Infermeria de Catalunya durant el curs 2015-16. Les preguntes incloïen informació sobre consum de tabac, formació i coneixements sobre el tractament del tabaquisme

Resultats: Patró de consum



Resultats: La participació va ser del 57,2% (n=4.381), variant d'una participació per centre del 35,4 al 81,9%. El 83,2% eren dones. El 31,2% dels estudiants fumaven, sense diferències per sexe ni curs, però sí per escoles (del 22,4 al 41,5%; p<0,001). La majoria havia rebut formació en tabaquisme: sobre el risc de fumar (80,6%) i el consum passiu (86,3%), però no sobre tractament (32,4%).

Conclusions

- La prevalença de consum dels estudiants d'infermeria de Catalunya és:
 - alta
 - augmenta amb l'edat
 - la prevalença de fumadors ocasionals elevada
 - sense diferències de sexe
- La gran majoria d'estudiants ha rebut formació sobre els riscos de fumar, activa i passivament i alguns tractaments farmacològics.
- La majoria reconeix el tabaquisme com una addicció però desconeix les tendències actuals en prevalença poblacional o mortalitat atribuïble.

Conclusions

- Només el 57,2% dels estudiants consideren que els professionals de la salut no haurien de fumar
- La formació rebuda en tractament no capacita per realitzar un tractament per al 65,1% dels alumnes
- Els fumadors són els estudiants que se senten més capacitats per al tractament

Recomanacions: Ciencia per l'acció

01 Implementar programes dirigits a la reducció de la prevalença del tabaquisme en estudiants d'infermeria



02 Dissenyar una formació que capaciti als estudiants d'infermeria en l'atenció al fumador



Escaneja el codi QR per accedir a l'estudi sencer